

## สรุปข้อมูลรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแผนปัจจุบัน ( SAS )

จากผู้ป่วยมีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแผนปัจจุบัน จำนวน 241 ราย จาก 11 โรงพยาบาล

ข้อมูล ณ 5 ธันวาคม 2562

ลักษณะ (characteristics)	จำนวน (ราย)
<b>เพศ</b>	
ชาย	142
หญิง	99
<b>โรงพยาบาล</b>	
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	105
โรงพยาบาลพุทธชินราช	27
โรงพยาบาลลำปาง	26
โรงพยาบาลอุดรธานี	25
โรงพยาบาลสระบุรี	20
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	18
โรงพยาบาลระยอง	10
สถาบันประสาทวิทยา	5
โรงพยาบาลหาดใหญ่	3
โรงพยาบาลบุรีรัมย์	1
โรงพยาบาลแพร่	1
<b>ชื่อผลิตภัณฑ์</b>	
GPO THC	122
GPO THC:CBD (1:1)	3
ยาน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น	57
ยาน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น สูตร THC 1.7%W/V	1
น้ำมันกัญชา Love hemp	26
<b>สาเหตุที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา</b>	
ผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคอง/ระยะสุดท้ายเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการปวด	80
ผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อใช้บรรเทาอาการปวด	30
ภาวะปวดประสาทที่ต่อการรักษา	33
โรคพาร์กินสัน	30
โรคลมชักที่รักษายากหรือต่อการรักษา	9
ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง	1
ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด	1

โรคอัลไซเมอร์	2
โรค/อาการอื่นๆ	19
- ผู้ป่วยโรค CML ไม่มีอาการ แต่ต้องการรักษาด้วยกัญชาและการแพทย์ทางเลือก	1
- myasthenia gravis	1
- Chronic intractable pain	4
- SLE	1
- spasm	1
- อาการนอนไม่หลับ	3
- มะเร็งต่างๆ เช่น ลำไส้ สมอ	5
- โรคลมชัก	1
- Polyneuropathy unspecified	1
- โรครูมาตอยด์	1
ไม่ระบุสาเหตุ	36
<b>ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์</b>	

พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา (ระบบ SAS) จำนวน 24 ฉบับ

(ผู้ป่วย 24 ราย) เป็นรายงานชนิดไม่ร้ายแรงทั้งหมด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จำนวนผู้ป่วย-อาการ (คู่)
อาการปากแห้ง (Mouth dry)	7
อาการคอแห้ง (Throat dry)	3
การทำหน้าที่ของไตผิดปกติ (Renal function abnormal)	2
นอนไม่หลับ (Sleeplessness)	2
ความวิตกกังวล (Anxiety)	1
อาการเดินเซ (Ataxia cerebellar)	1
ร้องไห้อย่างผิดปกติ (Crying abnormal)	1
เสียชีวิต (Death) จากสาเหตุอื่นไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์	1
อาการอ่อนเพลีย (Debility)	1
อาการเวียนศีรษะ (Dizziness)	1
ความดันเลือดต่ำ (Hypotension)	1
อาการใจสั่น (Palpitations)	1
อาการง่วงซึม (Somnolence)	1
รอยแผลเปิดแยก (Wound dehiscence)	1
<b>ผลรวมทั้งหมด</b>	<b>25</b>

\*หมายเหตุ - รายงาน 1 ฉบับ สามารถมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/ยาที่สงสัย ได้มากกว่า 1 รายการ

- ปริมาณอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ มีได้บ่งบอกถึงอุบัติการณ์ / ความเสี่ยงมากน้อยของผลิตภัณฑ์นั้น

ข้อมูลผลการประเมินหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา	
ข้อมูลผลการประเมิน	จำนวน (ราย)
ผลการประเมินประสิทธิผล	
อาการผู้ป่วยดีขึ้น	76
อาการผู้ป่วยไม่เปลี่ยนแปลง	15
อาการผู้ป่วยแย่ลง	1
ไม่ระบุ	149