

# ลูกเหมีนอันตราย จริงหรือ ?




ลูกเหมีน ดื้อ “แพฟทาลีน” เข้าสู่ร่างกายได้โดย



- การสูดดม
- สัมผัสกับผิวหนัง
- รับประทาน



หากเข้าสู่ร่างกายแล้วกำจัดให้ทัน  
จะทำให้เกิดเลือดແಡงแตก  
และเกิดภาวะเลือดจางตามมา



## สรุป

### ลูกเหมีนทำให้เกิดอันตรายจริง

หากสัมผัส รับประทาน หรือสูดไอระหายในปริมาณมาก  
แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้และการสัมผัลูกเหมีน

## หากจำเป็นต้องใช้ควรปฏิบัติตามนี้

1.



เก็บในตู้ปิดสนิท  
/ภาชนะปิดสนิท

2.



เก็บให้พ้นมือเด็ก และทารก

3.



ไม่ควรใช้ลูกเหมีน  
กับเสื้อผ้า ผ้าห่ม  
หรือของใช้ของเด็ก  
และทารก

4.



ก่อนใช้เสื้อผ้าหรือของใช้  
ที่มีการใช้ลูกเหมีนให้นำเสื้อผ้า  
ซักอีกครั้งก่อนใช้ กรณีของใช้  
ให้เช็ดทำความสะอาด

5.



ภายหลังการหยิบใช้  
ให้ล้างมือให้สะอาด  
ทุกครั้ง

## โปรดบังที่ห้ามใช้ลูกเหมีน



1. เด็กและทารก

2. ผู้มีภาวะพร่อง  
เอนไซม์จีชิกพีดี(G6PD)