

ไขข้อสงสัย กินยาคุมกำเนิด พร้อมกับยาฆ่าเชื้อได้หรือไม่

การใช้ยาคุมกำเนิดให้ได้ผลนอกจากจะต้องกินยาให้ถูกวิธีแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องระมัดระวังการกินยาอื่น ๆ ร่วมกับการกินยาคุมกำเนิดนั้น บางทีอาจทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลง ในวันนี้จะมาพูดถึงการใช้ยาฆ่าเชื้อ (ยาปฏิชีวนะ) บางตัวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมจะมีตัวยาระบบอะไรบ้าง มาติดตามกันเถอะ

ยาที่อาจลดประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิด

- ไรแฟมพิซิน (Rifampicin) เป็นยาที่ใช้รักษาวัณโรค
- ยากลุ่มเพนนิซิลลิน (Penicillins) เช่น แอมพิซิลลิน (Ampicillin), อะม็อกซิซิลลิน (Amoxicillin), ไดคล็อกซาซิลลิน (Dicloxacillin)
- ยากลุ่มเตตราไซคลีน (Tetracyclines) เช่น เตตราไซคลีน (Tetracycline), ด็อกซีไซคลีน (Doxycycline), ออกซีเตตราไซคลีน (Oxytetracycline)

ข้อแนะนำหากต้องกิน “ยาฆ่าเชื้อ” ร่วมกับยาเม็ดคุมกำเนิด

1. ไม่กินยาฆ่าเชื้อพร้อมกันกับยาเม็ดคุมกำเนิด ซึ่งยาเม็ดคุมกำเนิดควรรับประทานเวลาเดิมตามปกติ
2. ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หรือเพิ่มการคุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย ตลอดช่วงที่ใช้ยาไปจนถึง 7 วันหลังหยุดใช้ยาฆ่าเชื้อ
3. ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเม็ดคุมกำเนิดหรือเปลี่ยนไปใช้ตำรับที่มีปริมาณฮอร์โมนสูงขึ้น เนื่องจากไม่ได้เป็นที่ยืนยันว่าจะให้ผลดี อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลไม่พึงประสงค์จากยาฮอร์โมนได้



ไขข้อสงสัยกินยาคุมกำเนิด พร้อมกับยาฆ่าเชื้อได้หรือไม่



ยาฆ่าเชื้อบางตัว มีผลลดประสิทธิภาพยาคุมกำเนิด

ยาที่อาจลดประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิด



ไรแฟมพิซิน (Rifampicin)

ยากลุ่มเตตราไซคลิน (Tetracyclines) เช่น เตตราไซคลิน (Tetracycline),
ด็อกซีไซคลิน (Doxycycline), ออกซีเตตราไซคลิน (Oxytetracycline)

ยากลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillins) เช่น แอมพิซิลลิน (Ampicillin),
อะม็อกซิซิลลิน (Amoxicillin), ไดคล็อกซาซิลลิน (Dicloxacillin)



หากต้องกิน “ยาฆ่าเชื้อ” ร่วมกับยาเม็ดคุมกำเนิด



1. ไม่กินยาฆ่าเชื้อพร้อมกันกับยาเม็ดคุมกำเนิด
โดยยาเม็ดคุมกำเนิดควรรับประทานเวลาเดิมตามปกติ

ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือเพิ่มการคุมกำเนิด
โดยใช้ถุงยางอนามัย ตลอดช่วงที่ใช้ยาไปจนถึง 7 วัน
หลังหยุดใช้ยาฆ่าเชื้อ



3. ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเม็ดคุมกำเนิดหรือเปลี่ยนไป
ใช้ตำรับที่มีปริมาณฮอร์โมนสูงขึ้น

